


# お子さんのワクチン接種のモデル（5種混合ワクチン使用）

同時接種を前提としたモデルです。

生後2か月から2歳までの標準的なワクチンスケジュール



2か月になったらワクチンを受けましょう

ロタウイルスワクチンは生後15週未満で開始してください。

ロタウイルスワクチンはロタテック、ロタリックスがあり、どちらを選択して頂いても結構ですが、当クリニックではロタテックを推奨しています。

B型肝炎ワクチンにはヘプタバックスー とピームゲンがありますが、当クリニックではヘプタバックスー を推奨しています。


5種混合、肺炎球菌ワクチンは生後半年までに3回の接種を終了することをお勧めします。

ワクチンの同時接種を行うことにより、円滑に接種を進めることができます。

水痘ワクチンは1歳になったら受けましょう。2回目は1回目より6~12か月後に受けてください。

おたふくかぜワクチンは1歳になったら受けましょう。2回目は1回目から2~4年後に受けてください。(任意接種)

3歳以降の標準的なワクチンスケジュール



日本脳炎ワクチンは3歳以降が標準接種年齢です。

不活化ポリオワクチンは4~6歳の間に追加接種することが推奨されています。(任意接種)

百日咳予防のため年長でのDPTワクチン接種が推奨されています。新生児がいたり、これから赤ちゃんが誕生するご家庭では特に御考慮ください。(任意接種)

ワクチンの接種計画の参考にして下さい。

かわかみこどもクリニック

# お子さんのワクチン接種のモデル（4種混合ワクチン使用）

同時接種を前提としたモデルです。

## 生後2か月から2歳までの標準的なワクチンスケジュール

月齢	2	3	4	5	8	12~15	16~22
BCG							
四種混合(DPT-IPV)							
ヒブ							
肺炎球菌							
B型肝炎							
ロタウイルス			( )				
麻疹風疹(MR)							
水痘							
(おたふくかぜ)							
		4~8w					6~12m
			4~8w				

2か月になったらワクチンを受けましょう

ロタウイルスワクチンは生後15週未満で開始してください。

ロタウイルスワクチンはロタテック、ロタリックスがあり、どちらを選択して頂いても結構ですが、当クリニックではロタテックを推奨しています。

B型肝炎ワクチンにはヘプタバックスー とピームゲンがありますが、当クリニックではヘプタバックスー を推奨しています。

四種混合、ヒブ、肺炎球菌ワクチンは生後半まで3回の接種を終了することをお勧めします。

ワクチンの同時接種を行うことにより、円滑に接種を進めることができます。

水痘ワクチンは1歳になったら受けましょう。2回目は1回目より6~12か月後に受けてください。

おたふくかぜワクチンは1歳になったら受けましょう。2回目は1回目から2~4年後に受けてください。(任意接種)

## 3歳以降の標準的なワクチンスケジュール

年齢	3	4	年長	小4	小6	小6~高1
日本脳炎						
麻疹風疹(MR)						
(おたふくかぜ)						
二種混合ワクチン(DT)						
子宮頸がんワクチン						
(ポリオ)						
(三種混合ワクチンDPT)						
		12m				6m

日本脳炎ワクチンは3歳以降が標準接種年齢です。

不活化ポリオワクチンは4~6歳の間に追加接種することが推奨されています。(任意接種)

百日咳予防のため年長でのDPTワクチン接種が推奨されています。新生児がいたり、これから赤ちゃんが誕生するご家庭では特に御考慮ください。(任意接種)